

Действия в случае, когда нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы)

Правило первое. Встать на два колена и завести руку раненого за его голову.



Правило второе. Повернуть раненого на свои колени и очистить пальцами его ротовую полость.



Правило третье. Повернуть раненого на живот.


Пояснение

Когда челюсти раненого сжаты, не следует пытаться их разжимать. Плотно стиснутые зубы не препятствуют прохождению воздуха и жидкости.

Норматив

Время поворота раненого на живот в положении стоя на коленях не должно превышать **5-ти секунд**.

Правила транспортировки раненого в состоянии комы



Первый номер. Несет носилки за левую переднюю лямку, контролирует состояние раненого и сообщает позади идущему о возможных препятствиях.

Второй номер. Несет носилки за правую переднюю лямку, контролирует состояние раненого и сообщает позади идущему о возможных препятствиях.

Третий номер. Несет носилки в ногах за две задних лямки и готов в любой момент приступить к ведению огневого прикryтия.

Пояснение

Транспортировать раненого в состоянии комы можно только в положении «лежа на животе».

Норматив

Время от начала осмотра раненого и оказания первой медицинской помощи в укрытии до начала транспортировки на дальнейший этап эвакуации не должно превышать **2-х минут**.

Техника внутривенного капельного вливания растворов



1 Наложить жгут на плечо. Обработать место инъекции спиртовой салфеткой.



2 Ввести иглу под кожу срезом верху под углом не более 30°. При попадании в вену из канюли иглы появится кровь. Часто в первые минуты развития травматического шока из вены течет ярко алая кровь (симптом «алой вены»).



3 Распустить жгут. Подсоединить к игле канюлю капельной системы.

Норматив
Время монтажа системы и подсоединения ее к вене не должно превышать 2-х минут.



4 Прикрепить канюлю иглы, узел для дополнительных инъекций и трубочку капельной системы к коже лейкопластырем.



Отрегулировать колесиком скорость капельного введения раствора до 40-60 капель в минуту.

Правила переноса раненого на носилках с работающей системой капельного вливания растворов



Правило первое.

Третий номер. Несет пластиковый пакет с раствором, следит за работой капельницы и состоянием раненого.


Правило второе.

Нельзя опускать пакет с раствором ниже уровня руки раненого.

Правило третье.

При уменьшении количества раствора до 50 мл немедленно перекрыть введение раствора колесиком регулятора.

Оказание первой помощи раненому с обильным кровотечением из раны руки в секторе обстрела



Пояснение №1

Если при ранении плечевой артерии жгут не будет наложен в течение 30-40 минут, то раненый может погибнуть от невосполнимой потери крови.

Пояснение №2

Если при ранении плечевой артерии жгут наложен в первые пять минут после ранения, то боец может частично выполнять боевую задачу в течение часа или самостоятельно добраться до укрытия.

Пояснение №3

На поле боя нет возможности проконтролировать правильность наложения жгута. Поэтому его следует накладывать с максимальным усилием, и время его наложения не должно превышать 10 секунд.

Правила оказания первой помощи раненому с обильным кровотечением из раны руки в секторе обстрела

Правило первое.

Положить руку раненого на свое плечо.



Правило второе.

Наложить на плечо кровоостанавливающий жгут без контроля пульса на лучевой артерии.



Норматив

Время наложения кровоостанавливающего жгута на плечо не должно превышать **10-ти секунд**.